Mode d'emploi du médicament DONORMYL

Dans quel cas le médicament DONORMYL est-il prescrit ?

Ce médicament est un hypnotique (somnifère). Il contient un antihistaminique qui a un effet sédatif. Il possède également des propriétés atropiniques qui expliquent certaines contre-indications et certains effets indésirables.
Il est utilisé dans le traitement de l'insomnie.

Présentations du médicament DONORMYL

DONORMYL 15 mg : comprimé effervescent sécable (blanc) ; boîte de 10
DONORMYL 15 mg : comprimé sécable (blanc) ; boîte de 10

Composition du médicament DONORMYL

	p cp efferv	p cp
Doxylamine succinate	15 mg	15 mg
Sodium	484 mg	
Lactose		+

Substance active : Doxylamine succinate
Excipient commun : Macrogol 6000
Autres excipients (spécifiques à certaines formes) : Acide citrique, Bicarbonate de sodium, Cellulose microcristalline, Colorant, Croscarmellose sel de Na, Eau purifiée, Hypromellose, Lactose monohydrate, Magnésium stéarate, Phosphate disodique anhydre, Propylèneglycol, Sodium, Sodium benzoate, Sodium sulfate anhydre, Titane dioxyde

Contre-indications du médicament DONORMYL

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- glaucome à angle fermé,
- risque de rétention des urines (adénome de la prostate...),
- enfant de moins de 15 ans.

Attention Certaines insomnies peuvent traduire une dépression masquée et justifier un traitement spécifique.
Ce médicament présente des effets atropiniques. Il peut provoquer un glaucome aigu chez les personnes prédisposées : œil rouge, dur et douloureux, avec vision floue. Une consultation d'extrême urgence auprès d'un ophtalmologiste est nécessaire.
Ce médicament expose à un risque de chute nocturne chez la personne âgée ayant l'habitude de se lever la nuit.
Les comprimés effervescents contiennent du sel (sodium) en quantité notable.
Évitez les boissons alcoolisées : augmentation du risque de somnolence.
Ce médicament est un somnifère. Conduire ou utiliser une machine dangereuse dans les heures qui suivent sa prise est bien sûr contre-indiqué.
La durée de l'effet sédatif, ainsi que son intensité, est très variable d'une personne à l'autre. Il vous appartient de vérifier, après les premières prises, que la persistance éventuelle d'une somnolence au réveil est compatible avec la poursuite de vos activités habituelles.

Interactions du médicament DONORMYL avec d'autres substances

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez un autre médicament ayant des effets atropiniques ou sédatifs (tranquillisants, somnifères, certains médicaments contre la toux ou contre la douleur contenant des opiacés, antidépresseurs, neuroleptiques...).

Fertilité, grossesse et allaitement

Grossesse :
Ce médicament peut être utilisé pendant la grossesse, après avis médical.
En cas de prise en fin de grossesse, une surveillance du nouveau-né peut être nécessaire.
Allaitement :
Les données disponibles ne permettent pas de savoir si ce médicament passe dans le lait maternel : il est déconseillé pendant l'allaitement.

Mode d'emploi et posologie du médicament DONORMYL

Ce médicament doit être pris 15 à 30 minutes avant le coucher.
Les comprimés doivent être avalés avec un peu d'eau et les comprimés effervescents dissous dans un demi-verre d'eau.
Posologie usuelle :

- Adulte : 1/2 à 2 comprimés par jour selon la sensibilité individuelle.

La durée du traitement est limitée à 2 à 5 jours sans avis médical.

Conseils

Les somnifères ne sont pas la seule réponse aux troubles du sommeil. Une meilleure hygiène de vie, une consommation modérée d'excitants (y compris les boissons alcoolisées) permettent aussi de lutter efficacement contre les insomnies.

Effets indésirables possibles du médicament DONORMYL

Somnolence pendant la journée.
Rarement, effets atropiniques : troubles de l'accommodation, constipation, bouche sèche.

Merci de nous contacter pour toute demande ou interrogation.

Pharmacie Paget
2 rue Pasteur
81990 Puygouzon

Tél 05.63.54.11.02
Fax 05.63.38.96.10
pharmacie.paget@yahoo.fr

Votre santé, notre priorité

Si vos symptômes persistent, contactez votre médecin.